

Коинфекция ВИЧ и ВГС

Термин *коинфекция* употребляется когда человек заражён двумя вирусами одновременно. Поскольку пути заражения ВИЧ и гепатитом С (сокращенно ВГС) одни и те же, многие инфицированы и ВИЧ, и ВГС.

Понятно, что наличие двух заболеваний одновременно значительно осложняет задачу по поддержанию своего здоровья. ВИЧ-инфекция усугубляет гепатит С, поскольку в этом случае повреждение печени происходит быстрее. Поэтому очень важно, чтобы Ваш врач понимал, каким образом ВИЧ и ВГС воздействуют на Ваше здоровье. Некоторые больные наблюдаются одновременно у специалиста по заболеваниям печени и ВИЧ-доктора, которые совместно делают все возможное для поддержания здоровья пациента.

Поскольку лекарства от ВИЧ перерабатываются в печени, очень важно регулярно контролировать ее состояние и не допускать ее повреждения этими лекарствами.

Если анализы показывают, что печень плохо реагирует на лекарство от ВИЧ, доктор может назначить другой препарат.

Поговорите со своим врачом о лечении ВИЧ и ВГС

Важно помнить следующее:

Каждый инфицированный ВИЧ должен пройти тест на ВГС.

Состояние печени должно быть под постоянным контролем, так как лекарства от ВИЧ могут повредить печени.

Как ВИЧ, так и ВГС поддаются лечению, поэтому обсудите со своим доктором возможные варианты лечения для вас.

Сделайте прививки против гепатитов А и В, если до этого вы не были инфицированы.

Не впадайте в панику, а постарайтесь как можно больше узнать о ВИЧ и ВГС и вместе в вашем врачом делайте всё для поддержания своего собственного здоровья.

Простые С-факты

HIV / HCV
Coinfection



HCV ADVOCATE
www.hcvadvocate.org

Проект Поддержки
Больных Гепатитом С
www.hcvadvocate.org

Версия 1.0 • Апрель 2009